

リハビリテーション学研究科 修士論文要旨

リハビリテーション学専攻 修士課程	氏名 岡本 絵里加
修士論文題目	急性期病院における「なじみのある作業」を実施した認知症患者群と「なじみのある作業」を実施しなかった認知症患者群の作業療法の効果ーランダム化比較試験による検討ー
<p>論文要旨（英文）</p> <p>Objective : The purpose of this study is to determine an effectiveness of the Occupational Therapy performed "familiar occupation" for patients with dementia in the hospital for acute period.</p> <p>Method : The group divided into two at random that Occupational Therapy one is mainly on the body function approach only without performing "familiar occupation", the other is mainly on "familiar occupation" that subjects do from the evaluation results of Assessment by the Picture Cards for the Elderly with Dementia (APCD). The target number of patients assumed it 15 each group and assumed it 30 people in total.</p> <p>Result : As a result, compared the pre-evaluation final-evaluation of "familiar occupation" group with the not perform "familiar occupation" group, the significant differences were found on Mini Mental State Examination (MMSE), Dementia Behavior Disturbance Scale(DBD), Functional Independent Measure (FIM). A significant change was not found in Euro Quality of Life 5 demensions (EQ-5D).</p> <p>Consideration : It was suggested that Occupational Therapy presenting on "familiar occupation" was effective to improve cognitive function and reduce Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD), and the increase ADL ,and important activity for dementia patient than this study results.</p> <p>Conclusion : The patients with dementia performed "familiar work", and what teach it to possible for activity is important.</p>	
<p>論文要旨（和文）</p> <p>目的 : 本研究の目的は、急性期病院における認知症患者を対象とした「なじみのある作業」を実施した作業療法の効果を明らかにすることである。</p> <p>方法 : 対象者を、生活で重要としている「なじみのある作業」を中心に作業療法プログラムを実施する作業群と「なじみのある作業」を実施せず、身体機能アプローチを中心とした作業療法プログラムを実施する機能群をランダムに 2 群に分けた。対象者は各群 15 名とし、両群で 30 名に Mini Mental State Examination (以下, MMSE), Dementia Behavior Disturbance Scale (以下, DBD), Functional Independence Measure (以下, FIM), Euro QOL 5 demensions (以下, EQ-5D) を評価し、作業群と機能群の各群の初回と最終評価の比較、両群の初回と最終評価の差を比較した。</p> <p>結果 : 初回と最終評価の結果の比較から、作業群はすべての評価で有意差を認めた。機能群は FIM のみ有意差を認め、FIM 以外は有意差を認めなかった。両群における初回と最終評価の差の比較からは MMSE と DBD, FIM で作業群が有意な改善を認めた。EQ-5D には有意な変化が見られなかった。</p> <p>考察 : 本研究結果から認知症患者に「なじみのある作業」を中心とした作業療法は、認知機能や BPSD の軽減, ADL の向上, 生活で重要としている作業の獲得に有効であることが示唆された。</p> <p>結語 : 患者の身体機能や認知機能, ADL の向上を図ることは必要不可欠である。さらに、認知症のために困難なことや制限はあるが、「なじみのある作業」を実施し、その人らしい生活の活動ができるよう指導することが重要である。また、急性期の作業療法士として、包括的なリハビリテーションを実施し、早期からアプローチしていくことが重要であると考えられた。</p>	